

## **Ovinocultura**

Boletim Nº 8 – Janeiro de 2021

Gabriel Ribeiro Wiggers

## **PASTAGENS**

As pastagens são, na maioria das vezes, a principal fonte de energia na alimentação dos ruminantes, em função do seu custo-benefício.

Para uma escolha assertiva da espécie forrageira a ser instalada deve-se levar em consideração que os ovinos têm um hábito de pastejo diferente dos bovinos sendo eles mais seletivos, preferindo a fração mais tenra (nova) do pasto, e utilizam os dentes para apreender a forragem podendo pastejar rente ao solo.

Essas informações sugerem que é necessário tomar cuidado quanto ao sistema de pastejo (rotacionado ou contínuo) e quanto à lotação para evitar perdas no material forrageiro por sub ou superpastejo. Deve-se preferir espécies de hábito de crescimento prostrado que tenham o seu ponto de crescimento mais próximo do nível do solo.

Os ovinos têm o hábito de pastejar com a cabeça abaixada, logo devemos escolher espécies que sejam de porte médio ou baixo, apresentando ponto ótimo de pastejo em uma altura máxima em torno de 80 cm.

Além dos fatores já citados existem alguns outros que necessitam de atenção quanto à escolha da pastagem como: o poder de investimento do produtor, a forma de propagação da forrageira e suas exigências nutricionais, as propriedades físicas e químicas do solo e sua necessidade de adubação e calagem, o clima da região, a estação de utilização, o relevo, bem como todas as particularidades de cada propriedade.

Visto isso, as espécies estivais (de verão) mais recomendadas para ovinocultura são: Coast Cross, Estrela, Tifton (do Gênero *Cynodon*), Pangola (do gênero *Digitaria*), Pensacola (do gênero *Paspalum*). Já as hibernais (de inverno) mais utilizadas são: Aveia Preta (*Avena Strigosa*) ou Azevém (*Lolium multiflorum*).

Entretanto, existem espécies que devemos tomar cuidado: forrageiras do gênero Panicum podem ser utilizadas, porém algumas necessitam de ajustes no manejo de altura de entrada e saída dos animais assim como Brachiaria а brizantha. Já espécies Brachiaria as decumbens е ruziensis não são recomendadas pois favorecem а ocorrência fotossensibilização. de Enquanto as espécies Swanne bermuda (Cynodon dactylon), pasto negro (Paspalum plicatulum) е missioneira (Axonopus compressus) não são indicadas porque possuem baixa aceitabilidade.

Cada categoria animal tem uma exigência nutricional diferente que deve ser atendida, deste modo se somente a pastagem não for capaz de atendê-las deve-se complementar a dieta destes animais com concentrados formulados para cada categoria. Para obter melhores resultados consulte um profissional da área.

GEPEO - Grupo de estudo, pesquisa e extensão com ovinos.