# Monitoramento das populações da cigarrinha-do-milho e sua infectividade



**N° cigarrinhas/semana***

*Médias de 4 pontos/local amostrado

- 0 (ausência)
- 0,01 – 1
- 1,01 – 5
- 5,01 – 10
- >10
- Em análise

**Informações no mapa: 20/02 a 27/02/2023**

**Atualizado 4/03/2023**

## Flutuação populacional da cigarrinha-do-milho em SC

| Municípios | 16/01-23/01 | 23/01-30/01 | 30/01-06/02 | 06/02-13/02 | 13/02-20/02 | 20/02-27/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abelardo Luz | | | | | xx | xx |
| Água Doce | | | | | | xx |
| Campos Novos | | | | | xx | |
| Canoinhas (s) | | | | | | xx |
| Campo Erê (s) | | | | | | |
| Caxambu do Sul (s) | | | | | | |
| Chapecó (s) | | | | | | |
| Concórdia | | | | | | |
| Curitibanos | | | | | | xx |
| Dionísio Cerqueira | | | | | | xx |
| Dionísio Cerqueira (s) | | | | | | xx |
| Faxinal dos Guedes | | | | xx | xx | xx |
| Tunápolis (s) | | | | | | |
| Lages | | | | | | xx |
| Major Vieira | | | xx | xx | | xx |
| Morro da Fumaça (s) | xx | | | | | xx |
| Palmitos (s) | | | | | | |
| São Miguel do Oeste (s) | | | | | | |
| Taió | | | | | | xx |
| União do Oeste | | | | | | |
| Videira | | | | | | xx |
| N° médio/armadilha | 122,5 | 193,7 | 230,3 | 199,9 | 134,17 | 105,06 |

s = plantio safrinha; xx = amostras em processamento ou inexistentes




Epagri · UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina · CIDASC · OCESC Sindicato e Organização das Cooperativa do Estado de Santa Catarina · 50 anos FETAESC 1968 - 2018 · FAESC Federação da Agricultura e Pecuária – Santa Catarina · PROGRAMA MONITORA MILHO SC · CropLife Brasil · fapesc Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina · Governo de Santa Catarina Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural

**Comitê de Ação Contra a Cigarrinha-do-milho e Complexo de Enfezamentos**

# Monitoramento das populações da cigarrinha-do-milho e sua infectividade

| Municípios | 09/01-16/01 | 16/01-23/01 | 23/01-30/01 | 30/01-06/02 | 06/02-13/02 | 13/02-20/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abelardo Luz | - - | - + + | - - | - - | - - | xx |
| Água Doce | - - | + - + | - - + | + - + | - - | - - |
| Campos Novos | - - | - - + | + - + | - - + | - - | xx |
| Canoinhas (s) | - - | - - + | + - - | - - + | - - | xx |
| Campo Erê (s) | - - | - - + | - - - | - - + | - - | - - |
| Caxambu do Sul (s) | - - | - - + | - - + | - - + | + - | + - |
| Chapecó (s) | xx | - - + | - - + | - - - | - - | + - |
| Concórdia | - - | - - + | - - + | - - + | - - | - - |
| Curitibanos | xx | + - + | - - + | - - + | + - | + - |
| Dionísio Cerqueira | - - | - - + | + - - | + - + | - - | xx |
| Dionísio Cerqueira (s) | - - | - - + | - - - | - - + | + - | xx |
| Faxinal dos Guedes | - - | - - + | + - - | - - - | xx | xx |
| Tunápolis (s) | - - | - - + | + - - | - - - | - - | - - |
| Ituporanga | xx | - - + | + - + | + - + | - - | xx |
| Lages | - - | - - + | - - + | - - + | - - | - - |
| Major Vieira | - - | - - + | - - + | xx | xx | xx |
| Morro da Fumaça (s) | xx | xx | - - - | - - - | + - | xx |
| Palmitos (s) | - - | - - + | - - + | - - + | + - | + - |
| São Miguel do Oeste (s) | - - | - - + | + - - | - - + | - - | - - |
| Taió | xx | + - + | - - - | + - + | - - | - - |
| União do Oeste | - - | - - + | - - - | + - + | - - | - - |
| Videira | - - | - - + | + - + | - - - | - - | - - |
| % Infectividade | 0,0 | 62,9 | 55,7 | 75,6 | 8,2 | 22,9 |







**– Negativo espiroplasma + espiroplasma**
**– Negativo fitoplasma + Positivo fitoplasma**
**– Negativo vírus + Positivo vírus**
**xx : amostras em processamento ou inexistentes**
**Número de amostras analisadas por métodos moleculares = 2472**

As populações de cigarrinha-do-milho (*Dalbulus maidis*) estão elevadas na média estadual de Santa Catarina. As lavouras monitoradas na safra estão no período reprodutivo, e lavouras de safrinha estão na fase V3-V4. A infectividade com o vírus da risca tem sido maior em nossas diagnoses, seguido da infectividade com o espiroplasma. Recomenda-se a adoção do controle químico necessário quando há a presença desses vetores na fase inicial da lavoura, pois esses indivíduos podem migrar para cultivos de SAFRINHA, procurando por milhos mais novos.

**Mais informações**

https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/monitoramento-da-cigarrinha-do-milho/
https://www.udesc.br/cav/monitoramentodacigarrinhadomilho/
http://www.fetaesc.org.br/noticia/acompanhe-o-monitoramento-da-cigarrinha-do-milho/

## Comitê de Ação Contra a Cigarrinha-do-milho e Complexo de Enfezamentos