



# Monitoramento das populações da cigarrinha-do-milho e sua infectividade



## Flutuação populacional da cigarrinha-do-milho em SC

Municípios	09/01-16/01	16/01-23/01	23/01-30/01	30/01-06/02	06/02-13/02	13/02-20/02
Abelardo Luz	XX					XX
Água Doce						XX
Campos Novos						XX
Canoínhas (s)						XX
Campo Erê (s)						
Caxambu do Sul (s)						
Chapéco (s)	XX					
Concórdia	XX	XX	XX			XX
Curitibanos	XX	XX	XX			
Dionísio Cerqueira	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Dionísio Cerqueira (s)	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Faxinal dos Guedes	XX			XX	XX	XX
Tunápolis (s)						
Lages						XX
Major Vieira	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Morro da Fumaça (s)	XX	XX				XX
Palmitos (s)						
São Miguel do Oeste (s)						
Taió	XX					XX
União do Oeste						
Videira						
Nº médio/armadilha	70,5	122,5	193,7	230,3	199,9	144,5

s = plantio safrinha; xx = amostras em processamento ou inexistentes





# Monitoramento das populações da cigarrinha-do-milho e sua infectividade

Municípios	02/01-09/01	09/01-16/01	16/01-23/01	23/01-30/01	30/01-06/02	06/02-13/02
Abelardo Luz	- +	--	- + +	XX	XX	XX
Água Doce	--	--	+ - +	- +	+ - +	--
Campos Novos	- +	--	- +	+ - +	- +	--
Canoinhas (s)	+ - +	--	- +	+ - +	- +	--
Campo Erê (s)	--	--	- +	- +	- +	--
Caxambu do Sul (s)	- +	--	- +	- +	- +	+
Chapecó (s)	- +	XX	- +	- +	- +	--
Concórdia	--	--	- +	- +	- +	--
Curitibanos	--	XX	+ - +	- +	- +	+
Dionísio Cerqueira	- +	--	- +	+ - +	- +	--
Dionísio Cerqueira (s)	XX	--	- +	- -	- +	+
Faxinal dos Guedes	--	--	- +	+ - +	- -	XX
Tunápolis (s)	XX	--	- +	+ - +	- -	--
Ituporanga	XX	XX	- +	+ - +	- +	--
Lages	- +	--	- +	- +	- +	--
Major Vieira	+ -	--	- +	- +	XX	XX
Morro da Fumaça (s)	XX	XX	XX	- -	- -	+
Palmítos (s)	- -	--	- +	- +	- +	+
São Miguel do Oeste (s)	- +	--	- +	+ - +	- +	--
Taió	XX	XX	+ - +	- -	+ - +	--
União do Oeste	- +	--	- +	- -	- +	--
Videira	- +	--	- +	+ - +	- -	--
% Infectividade	22,8	0,0	62,9	55,7	75,6	8,2

- Negativo espiroplasma + espiroplasma
- Negativo fitoplasma + Positivo fitoplasma
- Negativo vírus + Positivo vírus

xx : amostras em processamento ou inexistentes

Número de amostras analisadas por métodos moleculares = **2417**



As populações de cigarrinha-do-milho (*Dalbulus maidis*) estão elevadas na média estadual de Santa Catarina. As lavouras monitoradas na safra estão no período reprodutivo, e lavouras de safrinha estão na fase V3-V4. A infectividade com o vírus da risca tem sido maior em nossas diagnoses, seguido da infectividade com o espiroplasma. Recomenda-se a adoção do controle químico necessário quando há a presença desses vetores na fase inicial da lavoura, pois esses indivíduos podem migrar para cultivos de SAFRINHA, procurando por milhos mais novos.

<https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/monitoramento-da-cigarrinha-do-milho/>

<https://www.udesc.br/cav/monitoramentodacigarrinhamilho/>

<http://www.fetaesc.org.br/noticia/acompanhe-o-monitoramento-da-cigarrinha-do-milho/>

Comitê de Ação Contra a Cigarrinha-do-milho e Complexo de Enfezamentos

Mais informações