


Diagnóstico

- Exame laboratorial (VDRL) com coleta de sangue.
- Teste rápido (só é válido para quem ainda não teve a doença). Esse teste pode ser realizado pelo enfermeiro não requerendo consulta médica.
- Os dois exames acima estão disponíveis na rede de saúde pública.



Tratamento

Antibióticos orais ou injetáveis são disponibilizados gratuitamente na rede pública.

Para gestantes o único medicamento que pode ser utilizado é a penicilina.

Após o término do tratamento é necessário refazer os exames periódicos até que a pessoa seja considerada curada.

Esses exames podem ser solicitados pelo médico e/ou enfermeiro.

Prevenção

- Não há vacina contra a sífilis.
 - O uso de preservativo é a única forma de proteção.
- O tratamento da pessoa diagnosticada e do(a) PARCEIRO(a) precisa ser iniciado imediatamente após o diagnóstico.
 - O tratamento precisa ser adequado, sem interrupções e associado ao uso de preservativos na relação sexual para evitar que se re-infecte.
 - A não adesão às medidas de cuidados é um dos motivos que fazem nascer crianças infectadas pela doença.
 - Antibióticos utilizados fora da recomendação médica causam resistência bacteriana.

Por isso:

- Tome nos horários/dias corretos;
- Apenas a dose recomendada;
- Não reutilize as sobras de antibióticos e nem jogue no lixo. Leve-as à unidade de saúde;
- Permanecendo os sintomas retorne ao médico.

SÍFILIS

CONHEÇA MAIS SOBRE ESSA EPIDEMIA E PREVINA-SE



GRUPO DE PESQUISA E EXTENSÃO:
Ambiente, Desenvolvimento e Saúde Humana

**MESTRADO PROFISSIONAL EM
ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA**

Mestranda: Enf^a. Saionara Vitória Barimacker

Orientador : Prof^o. Dr. Arnildo Korb

Participante: Prof^a. Dra. Leila Zanata

Acadêmicos: Daniela A. dos Santos, Andrieli Schmitz, Ana J. S. da Silva, Ana P. Dall Bello, Demile R. Carraro, Kéuri Zamban, Lucine F. de Bona

O que é sífilis?

É uma doença sexualmente transmissível.

Em raros casos pode ser transmitida por objetos como seringas e giletes, ou por transfusões sanguíneas.

Os jovens são os mais afetados.

Entre 2014 e 2015 o número de pessoas infectadas no Brasil aumentou 32,7%.

Em Santa Catarina, em 2015, foram 5.427 casos de infecção registrados.

Na gestação pode ser transmitida da mãe para o feto causando malformações, morte do fetal e aborto.

Em 2015 foram contaminadas 83 gestantes aumentando em mais de 200% em relação à 2014. E dessas mães nasceram 41 crianças com Sífilis Congênita.




Fonte: www.slideshare.net

Estágios da doença

SÍFILIS PRIMÁRIA

Entre 2 a 3 semanas após contaminação. Apresenta uma única lesão, não dolorosa, geralmente confundida com pelo inflamado. Os sintomas desaparecem entre 3 e 6 semanas. Sem tratamento causa falsa impressão de cura.



Fonte: www.fortenoreconcavo.com.br

SÍFILIS SECUNDÁRIA

Manifesta-se com erupções na pele, principalmente nas palmas das mãos e solas dos pés, além de pintas pelo corpo, podendo confundir com uma alergia. A pessoa ainda pode apresentar lesões na mucosa oral, febre, mal estar, perda do apetite, dor nas articulações, queda de cabelo, lesões oculares e "ínguas" em diversas regiões do corpo.




Fonte: www.mdsaude.com

**SOMENTE em Chapecó,
no ano de 2016, foram 517
novos casos em adultos.**

SÍFILIS TERCIÁRIA

(A forma mais grave da doença)

Permanece até várias décadas sem manifestar sintomas. As manifestações podem ir desde grandes lesões ulceradas na pele, ossos e órgãos internos, alterações cardíacas, e, ainda, neurosífilis que leva à demência, meningite, Acidente Vascular Encefálico e problemas motores por lesão na medula e nos nervos.




Fonte: www.saudecomplicada.com

Supérieure sífilis

Aprè faz an dezyèm bakteri yo ka rete nan kò a pou jiska 40 ane ak dyagnostik la yo pral mande pou tès laboratwa plis espesifik.

Nan moman sa a nan reyaktivasyon nan maladi a (Supérieure sífilis), gen konplikasyon grav ki mennen ale nan avèk, paralizi, maladi nan sèvo, zo, kadyovaskilè ak maladi newolojik, pwoblèm kè e menm lanmò.

Nan tout premye etap li se posib nan trete ak geri maladi a, men li se pa posib nan trete skèle a.



Fonte: www.saude.uem.br/comunicacao.com

KI KOTE E KI MOUN KI DWE FE EZAMEN AS?

Egzamen yo ap fèt nan 26 posts sante yo.

Tout moun ki te fè sèks te kòmanse epi yo pa te itilize kapòt, avèk oswa san sentòm yo.

Pi bonè dyagnostik la, pi senp la ak pi vit tretman an



IMPOTANS BON TRETMAN AK PREVANSYON

- Tout moun ki gen yon dyagnostik maladi a bezwen tretman an epi retounen nan etablisman sante a pou fè tès kontwòl apre fen tretman an.
- Nan ka pozitif, tout patenarya dwe egzekite tès dyagnostik la pou Syphilis.
- Sèvi ak yon kapòt nan rapò seksyèl, evite pataje zegwi, sereng, ak kontak ak san ak likid kò moun lòt moun.

SÍFILIS



GRUPO DE PESQUISA E EXTENSÃO:

Ambiente, Desenvolvimento e saúde humana

Mestranda: Saionara V. Barimacker
Orientador (a): Prof. Dr. Arnildo Korb,
Co-orientadora: Profa. Dra. Denise A. A. Zocchi.

Participantes: Profa. Dra. Leila Zanatta
Profa. Dra. Danielle B. Cabral
Acadêmicas: Daniela Aparecida dos Santos, Ana L. Streck, Tatiani Todero, Juliana H. Batista, Milena Lorenzini, Ana J. S. da Silva, Andrieli Schmitz

Créditos pela tradução: Nahum Saint Julien.

OU KONNEN KISA SIFILIS LA YE?

Sifilis se yon maladi moun kapab pran nan fe seks nan zegwi, san kontamine ak si manman genyen li nan san l li kap passe li pou pitit.

Lè tretman pa fet okòmansman li vini devlope nan twa etap.

Maladi sa manman ki ansent kapab bay timoun li.

Maladi sa ka lakòz foskouch, nesans anvan lè, ak malformasyon tankou soud, avèk ak defisyans mantal.

Pou diminye risk sa yo pou tibebe yo, klinik la pou pasyan ekstèn Syphilis pou fanm ansent ak tibebe ki fenk fèt yo ak Komite pou Rechèch sou Maladi Transmisyon vètikal yo te kreye nan 2015, ansanm ak klinik Women Chapeco.




Prensipal sífilis

Nan premye etap la (prensipal sífilis) li parèt nan zòn jenital (vajen) yon sa yo rele aksidan "chancker", fasil konfonn ak yon kò ki anfle, li paret klere san li pa fè mal.

Li pa gen mak ni li pap fe pij.

Li vini apre 21 jou apre kontak. Moun ki genyen li a pa gen lafyèv sentòm yo disparèt natirèlman nan twa semèn, sa fè sanble ke moun nan geri men ki pa vre.

Nan fanm aksidan sa a ka rive andedan kanal nan vajen epi ale inapèsi.



Fonte: www.foramoticon.com.br

Segondè sífilis

Apre sa, mukoza a nan bouch la vin melanje ak griv.

Sis mwa apre aksidan an premye disparèt, gen tach nan kò a epi, pafwa, konfonn ak alèji (segondè sífilis).

Kapab prezante penti kap dekalè plak nan men ak pye, pèt nan sousi, lafyèv, malèz, boul jeneralize. Sentòm ki pral disparèt natirèlman.

Nan etap sa a anpil moun endepandan medikaman ak anti-alèji ak mask maladi a.



Fonte imagens: Google.com